	Rete Ospedaliera SOS Infezioni Correlate all'Assistenza	Codice IO.DRO.51	Revisione 0	Pagina 1 di 4
	Istruzione Operativa Istruzione Operativa per la sanificazione atta alla riconversione dei setting assistenziali dedicati al Covid-19			

Istruzione Operativa per la sanificazione atta alla riconversione dei setting assistenziali dedicati al Covid-19

Data	Redazione	Verifica	Approvazione
23/02/2021	Referente gruppo di redazione: SOSD Infezioni Correlate all'assistenza Cinzia Melchiori	Processo Direttore SOSD Infezioni Correlate all'assistenza Anna Patrizia Poli	Direttore Rete ospedaliera Daniela Matarrese
		SGQ Direttore SOSD Governance clinico assistenziale Mauro Romilio	Direttore Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica Paolo Zoppi


Gruppo di redazione:

- Anna Poli, Direttore SOSD Infezioni Correlate all' Assistenza
- Elisabetta Innocenti, Dipartimento del Farmaco AUSLTC Farmacia P.O. Santa Maria Annunziata
- Cinzia Melchiori, Infermiere SOSD Infezioni Correlate all' Assistenza
- Daniela Patriarca, Coordinatore Infermieristico SOC Outsourcing ed Appropriatelyzza Consumi
- Emanuela Spadini, Infermiere SOSD Infezioni Correlate all' Assistenza

Supporto metodologico:

- SOSD Governance Clinico Assistenziale

Parole chiave: rischio infettivo, detersione, disinfezione

	Rete Ospedaliera SOS Infezioni Correlate all'Assistenza	Codice IO.DRO.51	Revisione 0	Pagina 2 di 4
	Istruzione Operativa Istruzione Operativa per la sanificazione atta alla riconversione dei setting assistenziali dedicati al Covid-19			

Indice

1. Premessa	2
2. Scopo/ Obiettivi	2
3. Campo di applicazione	2
4. Glossario e definizioni.....	2
5. Responsabilità e descrizione delle attività.....	2
6. Revisione.....	3
7. Riferimenti.....	3
8. Indice delle revisioni	4
9. Lista di diffusione	4

1. Premessa

In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Corona virus, inclusi i virus responsabili della malattia da SARS e da MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperatura fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di infezioni dovute a tali virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato. Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS CoV-2" (circolare ministeriale 5443 del 22/02/2020).

2. Scopo/ Obiettivi

Scopo della presente istruzione operativa è quello di fornire indicazioni in merito alla sanificazione per la riconversione dei reparti dedicati ai pazienti COVID.

3. Campo di applicazione

La presente istruzione operativa si applica al personale sanitario e tecnico e al personale delle ditte in appalto che effettuano la pulizia e la sanificazione ambientale.

4. Glossario e definizioni


DPI: Dispositivi di protezione individuale
COVID-19: Corona Virus Disease 19
SARS: Severe acute respiratory syndrome
MERS: Middle East Respiratory Syndrome

5. Responsabilità e descrizione delle attività

In seguito alla decisione da parte della Direzione Sanitaria di riconversione del reparto dedicato ai pazienti COVID positivi ad un reparto destinato a pazienti NON COVID, è necessario predisporlo per la pulizia e sanificazione, in quanto gli ambienti pieni di suppellettili e materiali vari non permettono di effettuare tutte le operazioni di sanificazione. Una completa sinergia fra i vari operatori permette il raggiungimento di obiettivi di efficacia e di efficienza.

Attività di pertinenza personale sanitario e tecnico del setting assistenziale

- predisporre i contenitori per i rifiuti speciali per l'allontanamento da parte della ditta di sanificazione;
- svuotare gli armadi di stoccaggio farmaci infusionali, presidi medici, biancheria;

	Rete Ospedaliera SOS Infezioni Correlate all'Assistenza	Codice IO.DRO.51	Revisione 0	Pagina 3 di 4
	Istruzione Operativa Istruzione Operativa per la sanificazione atta alla riconversione dei setting assistenziali dedicati al Covid-19			

- svuotare i carrelli presenti (farmaci, biancheria, medicazioni, cartelle cliniche);
- staccare la spina elettrica dei letti elettromedicali;
- allontanare gli apparecchi elettromedicali e procedere alla loro disinfezione con alcool a 70°.
E' inoltre utilizzabile l'ipoclorito di sodio al 0,1% - 0,5% se non presenti parti metalliche ma consultare sempre il manuale d'uso dell'apparecchio elettromedicale;
- svuotare il farma-frigo;
- staccare dalle pareti ogni tipologia di cartellonistica;
- allontanamento di materassi e cuscini previo imbustamento negli appositi sacchi forniti dalla lavanderia;
- tutti i materiali, i dispositivi medici e i farmaci, non contaminati, saranno riallocati negli appositi spazi dopo la pulizia e sanificazione.

Per quanto attiene agli interventi di pulizia dei sistemi di filtraggio e/o condizionamento dell'aria è necessario contattare l'area tecnica di competenza per:

- sostituzione filtri di condizionamento;
- eventuali processi di sanificazione che l'area tecnica ritiene necessario.

Attività di pertinenza della ditta di pulizia e sanificazione

Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro. Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato degli idonei DPI e seguire le corrette procedure per la vestizione e la svestizione (rimozione in sicurezza dei DPI). Le pulizie dovranno riguardare tutti gli ambienti del setting assistenziale interessato comprese le superfici dei supporti informatici (tastiere, stampanti, telecomandi).

- Allontanamento del materiale sporco e dei rifiuti correttamente confezionati
- Utilizzare carrelli per la pulizia dedicati
- Utilizzare panni in microfibra rispettando il codice colore o panni monouso
- Detergere tutte le superfici, orizzontali e verticali, con panni inumiditi con acqua e sapone
- Asciugare correttamente le superfici deterse
- Trattare con soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo rispettando i tempi di contatto
- Arieggiare gli ambienti durante e dopo le attività


I materiali che non possono essere sanificati con ipoclorito, dovranno essere trattati con alcool al 70% o benzalconio cloruro allo 0,2% oppure clorexidina digluconato allo 0,02% (questi ultimi due disinfettanti sono risultati, meno efficaci).

6. Revisione

La revisione si effettua su motivazioni sostanziali, e comunque si consiglia ogni tre anni.

7. Riferimenti

- Circolare Ministeriale 5443 del 22 febbraio 2020 - Indicazioni e chiarimenti del Ministero della Salute su COVID-19
- Ordinanza Presidente di Giunta Regionale n° 8 del 6 marzo 2020
- DPCM del 11 e del 14 marzo 2020
- Capitolato appalto ESTAR

	Rete Ospedaliera SOS Infezioni Correlate all'Assistenza	Codice IO.DRO.51	Revisione 0	Pagina 4 di 4
	Istruzione Operativa Istruzione Operativa per la sanificazione atta alla riconversione dei setting assistenziali dedicati al Covid-19			

- Raccomandazione ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza Covid-19: presidi medico chirurgici e biocidi Rapporto ISS Covid-19 n°19/2020 del 25/04/2020
- G. Kampf, D. Todt, S. Pfaender, E. Steinmann, "Persistence of coronavirus on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents" J. Hospital Infection 2020 Mar, 104(3): 246-51

8. Indice delle revisioni

Revisione n°	Data emissione	Tipo modifica	Titolo
0	23/02/2021	PRIMA EMISSIONE	

9. Lista di diffusione

- Direttore Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica
- Direttore Dipartimento Rete Ospedaliera
- Direttori SOC/SOS Dipartimento Assistenza Infermieristica e Ostetrica
- Posizioni Organizzative e Coordinatori Ospedalieri
- Infermieri e ostetriche della ASL Toscana Centro

Copia conforme all'originale